

# CAPILL Retard

30 tableta 800 mg

Pharma Italia  
LABORATORI FARMACEUTICI

*Tableta me mbeshtjellje hidrofibe të përbëra nga hypomellose,  
polimer hidrosolubil me pjesëza homogjene.*



**Veprimi flebocapilarotonik *Centella asiatica***

**Rrit në mënyrë sinjifikante fluksin sanguin dhe përmirëson simptomatologjinë edematoze dhe distensibilitetin (pandryshueshmerinë) venoz.**

**Veprimi drenues, fleboprotektiv *Melilotus officinalis***

**Kumarina siguron rikthimin limfatik duke reduktuar metabolizmin e katekolaminave (adrenalinës) duke përmirësuar kështu kapacitetin kontraktil vazal.**

**Veprimi antioksidant *Vitis vinifera***

**Rrit fluksin sanguin kapilar duke përmirësuar oksigjenimin e indeve. Përmirësimi i shenjave dhe simptomave të patologjive venoze të anesive inferiore ose të poshtme është më i dukshëm krahasuar me atë të fituar nga diosmina.**

# CAPILL Retard

30 tableta 800 mg

Pharma Italia  
LABORATORI FARMACEUTICI


## AVANTAZHET E CAPILL Retard

- mbulim terapeutik efikas në harkun e një ditë
- biodisponibilitet maksimal
- një kuti (ose 30 tab) = 1 muaj trajtim

## MËNYRA E VEPRIMIT



Pas afro 30 min nga marrja, tableta me mbështjellje hidrofil, hidratohet duke filluar të formojë një shtesë xheli i cili rregullon tretjen. Metabolitet aktiv arrijnë pikun pas afro 1 orë. Më pas shtesa e xhelit formohet e gjitha duke mundësuar daljen e metaboliteve aktiv të cilët hidhen në qarkullim në mënyrë graduale.



## INDIKACIONET

- Insuficiencë venoze e venolimfatike e anësive të poshtme
- Insuficiencë vaskulare retinale
- Hemorroide exsterne dhe interne

## DOZA

Për indikacionin e parë dhe të dytë 1 tabletë në mëngjes, preferohet esëll, në cikle 2-3 mujore, të ndarë në intervale 30 ditore (ndërprerje).

*Kurse në hemoroide merren 3 tableta në ditë para buke çdo 8 orë.*