

HYDRA MIN

**ZEVENDESUES DIETETIK
I KRIPERAVE MINERALE**



FUQIA E KOMBINIMIT

Klor (Cl^-) 165.6 mg: luan rol thelbësor në ruajtjen e ekuilibrit hidro-elektrolitik qelizor. Klor-i është anioni kryesor që përmban lëngu gastrik.

Natrium (Na^+) 134.8 mg: luan rol në rregullimin e përshkueshmërisë së membranës qelizore

Magnezium (Mg^{++}) 104.4 mg: luan rol në një sërë mekanizmash rregullatorë në nivelin muskular dhe nervor.

Kalium (K^+) 38.3 mg: luan rol thelbësor në transmetimin e impulsit nervor, kontrollin e kontraksioneve muskulare dhe rregullimin e presionit arterial.



INDIKACIONET

HYDRAMIN indikohet në të gjithë rastet kur nevojitet zëvendësim dhe/ose ruajtje e lëngjeve dhe elektrolitëve në organizëm:

- Ç'rregullimet gastro-intestinale me origjinë të ndryshme të shoqëruara me diarre dhe/ose të vjella.
- Gjendjet që shoqërohen me humbje të mëdha të ujit dhe elektrolitëve përmes djersitjes brenda një periudhe të shkurtër kohore si psh. ushtrimet fizike, temperaturat e larta, ekspozimi në diell.

DOZIMI & MENYRA E PERDORIMIT

- Rekomandohet një bustinë në ditë por doza e HYDRAMIN është individuale dhe duhet t'i përgjigjet kërkesave individuale të çdo personi.
- Përmbytja e plotë e një bustine HYDRAMIN tretet në një gotë uji 200 ml ose në 500 ml ujë të pijshëm në temperaturën e mjedisit. Solucioni i përfutur pihet menjëherë (në rastin kur përmbytja tretet në gotën 200 ml me ujë të pijshëm) ose ngadalë (në rastin kur përmbytja tretet në 500 ml ujë të pijshëm). Përmbytja e një bustine përdoret vetëm një herë. Në rast nevojë të mëtejshme duhet të përgatitet përmbytja e një bustine tjetër HYDRAMIN.

KUNDERINDIKACIONET

HYDRAMIN nuk duhet përdorur në:

1- Diarretë e rënda të vazhdueshme ose në ndonjë gjendje tjetër që kërkon dhënien e lëngjeve me rrugë parenterale. 2- Pacientët me insuficiencë të rëndë renale (oliguri ose anuri). 3- Obstruksionet ose perforacionet e traktit tretës. 4- Gjendjet e hiperkalemisë me origjinë të ndryshme (acidozë diabetike, dëmtimet masive të indeve të buta, krizat hemolitike të rënda, etj).

KUJDESI GJATE PERDORIMIT

HYDRAMIN duhet të përdoret me kujdes në:

1- Pacientët me insuficiencë kardiake ose gjendjet e tjera që mund të ndikojnë në ekskretimin e K^+ nga veshka. 2- Nuk duhet të tretet në lëngje që përmbyjnë elektrolitë, të tilla si qumështi ose lëngjet e frutave. 3- Humbjet e mëdha të lëngjeve duhet të trajtohen me dhënien e lëngjeve me rrugë parenterale. 4- Gjatë shtatzënisë dhe ushqyerjes me gji mund të përdoret vetëm kur konsiderohet domosdoshmërisht e nevojshme dhe të mirat e mundshme të përdorimit të tejkalojnë rrezikun për fetusin dhe nënën. 5- Asnjë efekt anësor nuk është vërejtur gjatë përdorimit të HYDRAMIN. Megjithatë nëse të vjellat janë gjithashtu të pranishme dhe dozat e administruara janë më të larta dhe/ose më të shpeshta se ato të rekomanduara, të vjellat mund të përkeqësohen. Të vjellat ndalojnë me rregullimin e duhur të frekuencës së marrjes dhe /ose sasisë së administruar.

 **12 bustina x 8g**
Shije Mjedere



Distributorekskluziv për Shqipërinë
e-mail: info@omegafarma.com
www.omegafarma.com

